

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vitofyllin 100 mg filmtabletta kutyák részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Animalcare Limited
Common Road,
Dunnington,
York, YO19 5RU
Egyesült Királyság

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstraße 1, D – 29439 Lüchow
Németország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Vitofyllin 100 mg filmtabletta kutyák részére A.U.V.
(Propentofillin)

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:

Minden tablettá 100,00 mg propentofillint tartalmaz.

Segédanyagok:

Vas-oxid, sárga (E 172)	0,150 mg/tabletta
Titánium-dioxid (E 171)	0,430 mg/tabletta

Filmtabletta.

Sárga, kör alakú, domború tablettá, melynek egyik oldalán negyedelő törővonal, másik oldalán „100” felirat látható. A tablettá kettő vagy négy egyenlő részre osztható.

4. JAVALLAT(OK)

Az agyi és a perifériás vérkeringés javítására. Kutyákon jelentkező tompultság, letargia és az általános állapot javítására.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem adható vemhes vagy szoptató szukáknak és tenyészállatoknak.

Nem adható 5 kg-nál kisebb testtömegű kutyáknak.

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLEKHATÁSOK

Néhány alkotóval észlelték allergiás bőrreakciót, hányást és szívrendellenességet. Ilyen esetben a kezelést azonnal fel kell függeszteni.



Ha súlyos, nem kívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A propentofillin általános adagja 6-10 mg /ttkg naponta, két 3-5 mg/ttkg-os adagra elosztva, az alábbiak szerint:

Testtömeg (kg)	Tabletta száma		Napi összes tablettaszáma	Napi teljes adag (mg/kg)
	dél előtt	dél után		
20 - 33 kg	1	1	2	6,0 – 10,0
34 - 49 kg	1½	1½	3	6,1 – 8,8
50 - 66 kg	2	2	4	6,1 – 8,0
67 - 83 kg	2½	2½	5	6,0 – 7,5

Még pontosabb adagolást lehet elérni a 100 mg-os tablettá negyedelésével vagy a 100 mg-os és az 50 mg-os tabletták kombinálásával. A 20 kg-nál alacsonyabb testtömegű kutyáknak a Vitofyllin 50 mg filmtabletta adható.

A tablettát vagy közvetlenül a nyelv hátsó részére helyezve vagy az állat eledelének kis mennyiségébe keverve kell beadni, az etetés előtt legalább 30 perccel.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

10. ÉLEMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

(Nem értelmezhető)

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

A buboréksomagolást a kartondobozban kell tartani és száraz helyen kell tárolni. A részben felhasznált tablettákat az eredeti buboréksomagolásban kell tárolni és a tablettarészeket 72 óra után meg kell semmisíteni.

Csak a buboréksomagoláson és a kartondobozon feltüntetett lejárati időn belül (EXP) szabad felhasználni.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

A specifikus betegségeket (pl. vesebetegség) a megfelelő módon kell gyógykezeltetni. Pangásos szívelégtelenség vagy a hörgők megbetegedése miatt már korábban kezelt kutyáknál a készítmény alkalmazása megfontolandó. Veseelégtelenség esetén az adagot csökkenteni kell.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Kerülni kell a készítmény véletlen lenyelését.

A készítmény használata után kezét kell mosni.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok) ha szükséges

A készítmény használata során izgatottság, szapora szívdobogás, alacsony vérnyomás, a nyálkahártyák kivörösödése és hányás előfordulhat. Ezek a tünetek a kezelés abbahagyásakor spontán megszűnnek.



13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2012. május 2.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A propentofillin bizonyítottan fokozza a szív- és a vázizmok vérellátását. Hasonlóképpen serkenti az agy vérellátását is, ezáltal fokozva annak oxigén-ellátottságát, ugyanakkor nem növeli meg az agy glükózigényét. A propentofillin enyhe pozitív kronotróp és kifejezett pozitív inotróp hatással rendelkezik. Ezen kívül bizonyított, hogy a propentofillin miokardiális isémiás kutyáknál anti-arritmiás hatást vált ki, és az aminofillinhez hasonlóan hörgőtágító hatású.

Gátolja a vérlemezkék összecsapódását és javítja az eritrociták áramlási jellemzőit.

Közvetlen hatást gyakorol a szívre, a perifériás vaszkuláris ellenállás csökkentésével mérsékli a szív terhelését.

A propentofillin, elsősorban az idősebb kutyáknál, javíthatja a terhelhetőséget és növelheti a mozgásra való hajlandóságot.

14 tableta buboréksomagolásban (polivinil-klorid – polivinilidén-diklorid/alumínium),
1 kartondoboz 4 buboréksomagolást tartalmaz (56 tableta).

14 tableta buboréksomagolásban (polivinil-klorid – polivinilidén-diklorid/alumínium),
1 kartondoboz 10 buboréksomagolást tartalmaz (140 tableta).

Előfordulhat, hogy nem minden kiserelés kerül kereskedelmi forgalomba.

